

Jó napot Árnyc Úr,

Gyakorlati eredmények alapján új adagolást dolgoztam ki, mely nálunk rendkívül jól bevált.

- 1. Rendszeres adagolás ½ üveg 12 óránként 3 hónapon keresztül, a betegségek többségénél.**
- 2. Autoimmun krónikus megbetegedéseknél, idegdegradációnál az adagolás a következő:
3 hétig: 6 óránként ½ üveg
3 hónapig: 12 óránként ½ üveg**

Ez a módszer nagyon jól bevált még a nehéz onkológiai állapotoknál is, kemoterápia és radioterápia kiegészítéseként. A páciensek rendkívül jól reagálnak, ha a Matuzalemet a műtét előtt és a műtét után kapják, megelőzik így a műtét utáni probléma és komplikáció többségét.

Kiderült, hogy amennyiben az emberek a (minden típusú) műtét előtt és a műtét után szedik a Matuzalemet, az állapotuk lényegesen jobb, és minden simább lefolyású.

Minden esetre a Matuzalemmel való munka rendszerességet kíván, kiderült, hogy a hatás eléréséhez az első három hétben legalább 1 üveget kell meginni 24 óránként, tehát 2 dobozt 24 üveget, ezért legalább 21 napos kúrát javaslunk, amennyiben az ember nem érzi jól magát.

Preventív adagolás: a dobozon szerepel, napi 1 üveg összesen 12.

Az onkológiai betegségeknel az eredmény:

**Első három hétig: ½ üveg 6 óránként!
Első három hónapig: ½ üveg 12 óránként**

Három hónap elteltével folytatni kell az adagolást ½ üveg 12 óránként, amennyiben a páciens kemoterápiát vagy radioterápiát kap. Nem szüneteltetni! Miután a ciklus véget ér ezzel az orvos által előírt onkológiai kezelésre gondolok át lehet térni a preventív adagolásra a későbbi újbóli megbetegedés megelőzése érdekében.

Onkológiával ragyogó eredményeket értünk el, Matuzalem képes eliminálni a kemo- és radioterápia negatív hatásainak 90%-át, ami rendkívül fontos.

A beteg ezzel a rendszerrel 15 csomag Matuzalemet szed be az első félév folyamán, azután a preventív adagolás a következőképpen néz ki:

½ üveg 12 óránként 3 héten keresztül (tehát 2 CSOMAG), ezután 3 hét szünet, ezután ismétlés. Ezt 1 évig kell betartani, azután újból lehet tartani egy 3 hónapos szünetet.

Ezek azon páciensek gyakorlati tapasztalatai, akik rendelkezésünkre bocsátották a kórlapjaikat. Az onkológiai problémáknál a tapasztalatok hatására a fent leírt adagolást használtuk, valamint a Matuzalem folyékony formáját. A jövőben a tablettás verziót is lehet majd használni, mely 2010. június eleje körül jelenik meg a piacon.

Üdvözlettel!

Keresztes

Dobry den p.Arnyek,

nasiel sme na zaklade praktickych vysledkov nove davkovanie, ktore sa u nas mimoriadne dobre osvedcilo.

- 1. Davkovanie pravidelne 1/2 flasticky kazdych 12 hodin pocas obdobia 3 mesiacov, pri vacsine ochoreni**
- 2. Davkovanie pri chronickych ochoreniach autoimunitneho sysemu, nervovych degeneracii - davkovanie je:**
 - 3 tyzdne: kazdych 6 hodin 1/2 flasticky**
 - 3 mesiace kazdych 12 hodin 1/2 flasticky**

Takyto sposob sa nam velmi dobre osvedcil aj pri tazkych onkologickych stavoch, pri podpore chemoterapie a radioterapie. Pacienti velmi dobre reaguje pokiaľ sa Matuzalem podava pred, a po operaciach , vyhnu sa vacsine postoperativnych problemov a komplikaciam.

Zistili sme, ze pokiaľ ludia beru pred a po operacii (vsetkych druhov) Matuzalem, tak ich stav je spravidla podstatne lepsi a vsetko ma hladsi priebeh.

Kazdopadne praca s Matuzalemom je systemova, zistili sme, ze pre efektivitu je potrebna prve 3 tyzdne prijat aspon 1 flasticku denne kazdych 24 hodin, t.j. 2 balenia - 24 fl. , doporučujte preto kuru aspon 21 dni, pokiaľ sa clovek neciti dobre.

Preventivne davkovanie: je napisane na kartone, to je 1fl denne - 12 celkom.

Pri onkologickych ochoreniach je vysledok:

Prve tri tyzdne: 1/2 fl. kazdych 6 hodin!

Prve tri mesiace: 1/2fl. kazdych 12 hodin

Po troch mesiacoch treba pokracovat dalej davkovanim 1/2 fl. kazdych 12 hodin, pokiaľ pacient je na chemoterapii alebo radioterapii. Neprerusovat ! Ked cely cyklus skonci - myslim tym naordinovanu onkologicku liecbu lekarom) tak potom sa da prejst na preventivne davkovanie kvoli vyluceniu v buducnosti recidivy.

S onkologiou mame vynikajuce vysledky, Matuzalem dokaze eliminivat az 90% negativnych ucinkov chemo a radio terapie, co je velmi dolezite.

Celkovo clovek potrebuje tymto systemom uzit 15 baleni Matuzalemu v priebehu prveho polroka, potom preventivne davkovanie vyzera takto:

1/2 flasticky kazdych 12 hodin pocas 3 tyzdnov (t.j. 2 BALENIA), potom prstavka 3 tyzdne a opat zopakovat. Toto dodrzat 1 rok, potom m oze byt prestavka 3 mesiace.

Toto su prakticke skusenosti od pacientov, ktory nam poskytli zdravotne zaznamy. Na onkologicke problemy sme pouzili po skusenostiach vyssie opisane davkovanie a tekutu ormu Matuzalemu. Do buducna sa da pouzit aj tabletkova, ktora pride na trh zaciatkom Juna 2010.

S pozdravom,

Kerestes